

REC'D 09 OCT 2000

WIPO - Munich PCT

EPO - 34

14. Sep. 2000



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

EP 00/07251

**Aktenzeichen:**

100 11 723.6

**Anmeldetag:**

10. März 2000

EU

**Anmelder/Inhaber:**

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen/DE

**Bezeichnung:**

Modifizierte Cytochrom P450-Monooxygenasen

**IPC:**

C 12 N 9/02

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der  
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 10. August 2000  
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident  
Im Auftrag

*Heiler*

**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

**Seller**

## Modifizierte Cytochrom P450-Monooxygenasen

Die vorliegende Erfindung betrifft modifizierte Cytochrom  
5 P450-Monooxygenasen mit verändertem Substratprofil, dafür kodie-  
~~rende Nukleinsäuresequenzen, Expressionskonstrukte und Vektoren,~~  
~~rekombinante Mikroorganismen, welche diese Vektoren enthalten so-~~  
~~wie Verfahren zur mikrobiologischen Herstellung terminal oder~~  
~~subterminal hydroxylierter aliphatischer Carbonsäuren.~~

10

Die Monooxygenase mit der Bezeichnung P450 BM-3 ist ein Cytochrom  
P450-Enzym aus *Bacillus megaterium* und besitzt eine ausgeprägte  
Sequenzhomologie mit P450-Enzymen aus Säugern (1). Aufgrund die-  
ser Übereinstimmungen stellt P450 BM-3 ein ausgezeichnetes Mo-  
15 dellsystem für diese Klasse von P450-Enzymen dar. P450 BM-3 hy-  
droxyliert in erster Linie langkettige gesättigte Fettsäuren an  
ihrem  $\omega$ -1-,  $\omega$ -2- und  $\omega$ -3-Kohlenstoffatom. Amide oder Alkoholana-  
loga und Epoxide langkettiger ungesättigter Fettsäuren werden  
ebenfalls umgesetzt (1-3). Die ~~katalytische Aktivität~~ für gesät-  
20 tigte Fettsäuren ist abhängig von der Kettenlänge, wobei das Ket-  
tenlängen-Optimum bei 14 bis 16 Kohlenstoffatomen liegt. Das En-  
zym zeigt ~~keine katalytische Aktivität für Fettsäuren mit einer~~  
~~Kettenlänge von weniger als 12 Kohlenstoffatomen.~~ (1).

25 Zusammenfassung der Erfindung

~~Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, Cytochrom~~  
~~P450-Monooxygenase-Mutanten bereitzustellen, welche im Vergleich~~  
~~zum Wildtyp-Enzym ein modifiziertes Substratprofil zeigen. Insbe-~~  
30 ~~sondere sollten neue Mutanten bereitgestellt werden, welche ge-~~  
~~sättigte aliphatische Carbonsäuren in anderer Kettenposition hy-~~  
~~droxylieren und/oder eine modifizierte Substratspezifität besit-~~  
~~zen. Vor allem sollten Mutanten bereitgestellt werden, welche ka-~~  
~~talytische Aktivität gegenüber aliphatischen Carbonsäuren mittle-~~  
35 ~~rer Kettenlänge, insbesondere mit einer Kettenlänge von 8 bis 12,~~  
~~wie z. B. 8 bis 10 Kohlenstoffatomen besitzen, und diese subter-~~  
~~terminal, vor allem an den Positionen  $\omega$ -1,  $\omega$ -2 und/oder  $\omega$ -3 hydroxy-~~  
~~lieren.~~

40 ~~Diese Aufgaben wurden überraschenderweise gelöst durch Bereit-~~  
~~stellung modifizierter Cytochrom P450-Monooxygenasen, welche~~  
~~durch eine Kombination aus gerichteter Evolution und ortsspezifi-~~  
~~scher Mutagenese ihres Substrat-bindenden Bereichs im Vergleich~~  
~~zum Wildtyp ein verändertes Reaktivitätsmuster bei der terminalen~~  
45 ~~und/oder subterminalen enzymatischen Hydroxylierung von aliphati-~~  
~~schen Carbonsäuren zeigen.~~

## 2

Ein "verändertes Substratprofil" bedeutet in Rahmen der vorliegenden Erfindung a) eine Verbesserung der Reaktivität der Mutante gegenüber zumindest einer hydroxylierbaren aliphatischen Carbonsäure oder einem hydroxylierbaren Carbonsäurederivat im Vergleich zum Wildtyp-Enzym und/oder b) eine Verschiebung der bevorzugten terminalen oder subterminalen ( $\omega$ -1,  $\omega$ -2,  $\omega$ -3,  $\omega$ -4, insbesondere  $\omega$ -1 bis  $\omega$ -3) Hydroxylierungsposition an wenigstens einer hydroxylierbaren Carbonsäure oder einem hydroxylierbaren Carbonsäurederivat.

10

Die erfindungsgemäßen Monooxygenasen sind vorzugsweise abgeleitet von Cytochrom P450 Monooxygenasen der Enzymklasse E.C. 1.14.--., insbesondere aus der P450-Familie CYP102, und sind eukaryotischen oder prokaryotischen, insbesondere bakteriellen Ursprungs.

15

Eine besonders bevorzugte Gruppe von Mutanten ist abgeleitet von Cytochrom P450 Monooxygenase BM-3 aus *Bacillus megaterium* mit einer Aminosäuresequenz gemäß SEQ ID NO:2, welche wenigstens eine funktionale Mutation in einem der folgenden Aminosäuresequenzbereiche aufweist: 24-28, 45-51, 70-72, 73-82, 86-88, 172-224 und 352-356, mit der Maßgabe, dass mehr als einer dieser Bereiche mutiert ist, wenn das Enzym die Mutation F87A trägt; sowie funktionale Äquivalente dieser Mutanten.

25 Die jeweilige Mutation wird im Rahmen der vorliegenden Beschreibung im Aminosäure-Einbuchstabencode angegeben. Vor der Zahl, welche die Sequenzposition der Mutation bezeichnet, ist die ursprüngliche Aminosäure, nach der Zahl die modifizierte Aminosäure angegeben.

30

Eine "funktionale Mutation" im Sinne der vorliegenden Erfindung umfasst einen Aminosäureaustausch in den genannten Sequenzbereichen, welcher zu einem "veränderten Reaktivitätsmuster" gemäß obiger Definition führt.

35

Besonders bevorzugt sind erfindungsgemäß P450 BM-3-Monooxygenase-Mutanten, welche wenigstens je eine funktionale Mutation in den Aminosäuresequenzbereichen 86-88 und gegebenenfalls 172-224 (gemäß SEQ ID NO: 2) enthalten.

40

Eine erste Gruppe (A) geeigneter Mutanten weisen wenigstens eines der folgenden Aminosäuresubstitutionsmuster auf:

- a) F87V;
- 45 b) F87A, L188K;
- c) F87V, L188K;
- d) F87A, L188K; A74G;

3

- e) F87V, L188K, A74G;
- f) F87A, L188K, A74G, R47F;
- g) F87V, L188K, A74G, R47F;
- h) F87A, L188K, A74G, R47F, V26T; oder
- 5 i) F87V, L188K, A74G, R47F, V26T;

sowie funktionale Äquivalente davon.

Eine weitere Gruppe (B) geeigneter Mutanten weist eine einzelne  
10 der folgenden Aminosäuresubstitutionen auf:

- a) V26T,
- b) R47F,
- c) S72G,
- 15 d) A74G,
- e) F87V,
- f) L188z, worin z für K, R, W, Q, N, G, A oder S steht,  
und
- g) M354T;

20

sowie funktionale Äquivalente davon.

In obigen Aufstellungen sind die Aminosäuren im Einbuchstabencode  
angegeben. Die durch Mutation erzeugte neue Aminosäure steht  
25 rechts neben der Positionsangabe für die Mutation.

Unter "funktionalen Äquivalenten" versteht man erfindungsgemäß  
Mutanten, welche in wenigstens einer der oben genannten Sequenz-  
positionen eine andere als die konkret genannte Aminosäuresubsti-  
30 tution aufweisen, aber trotzdem zu einer Mutante führen, die  
ebenso wie die konkret genannte Mutante ein gegenüber dem Wildtyp  
"verändertes Reaktivitätsmuster" gemäß obiger Definition zeigen.  
Funktionale Äquivalenz ist insbesondere auch dann gegeben, wenn  
die Veränderungen im Reaktivitätsmuster qualitativ übereinstim-  
35 men.

"Funktionale Äquivalente" umfassen natürlich auch

P450-Monooxygenase-Mutanten, welche in gleicher Weise wie die  
konkret genannten P450-BM3-Mutanten durch Mutation von P450-Enzy-  
40 men aus anderen Organismen zugänglich sind. Beispielsweise lassen  
sich durch Sequenzvergleich Bereiche homologer Sequenzregionen  
festlegen. Mit den modernen Methoden des Molecular Modeling kön-  
nen dann in Anlehnung an die konkreten Vorgaben der Erfindung  
äquivalente, das Reaktionsmuster beeinflussende Mutationen vorge-  
45 nommen werden.

"Funktionale Äquivalente" umfassen ebenso die durch eine oder mehrere zusätzliche Aminosäure-Additionen, -Substituenten, -Deletionen und/oder -Inversionen erhältlichen Mutanten, wobei die genannten zusätzlichen Veränderungen in jeglicher Sequenzposition 5 auftreten können, solange sie zu einer Mutante mit "verändertem Reaktivitätsmuster" im obigen Sinne führen.

Gegenstand der Erfindung sind außerdem Nukleinsäuresequenzen, kodierend für eine mutierte Monooxygenase oder ein "funktionales 10 Äquivalent" gemäß obiger Definition. Diese Sequenzen sind vorzugsweise von SEQ ID NO: 1 durch Austausch von Codons entsprechend der obigen Aminosäuresubstitutionsmuster erhältlich.

Erfindungsgemäß umfasst sind auch solche Nukleinsäuresequenzen, 15 die sogenannte stumme Mutationen umfassen oder entsprechend der Codon-Nutzung eines speziellen Ursprungs- oder Wirtsorganismus, im Vergleich zu einer konkret genannten Sequenz verändert sind, ebenso wie natürlich vorkommende Varianten davon.

20 Gegenstand der Erfindung sind außerdem Expressionskonstrukte, enthaltend unter der genetischen Kontrolle regulativer Nukleinsäuresequenzen eine für eine erfindungsgemäße Mutante kodierende Nukleinsäuresequenz; sowie Vektoren, umfassend wenigstens eines dieser Expressionskonstrukte.

25 Vorzugsweise umfassen die erfindungsgemäßen Konstrukte 5'-stromaufwärts von der jeweiligen kodierenden Sequenz einen Promotor und 3'-stromabwärts eine Terminatorsequenz sowie gegebenenfalls weitere übliche regulative Elemente, und zwar 30 jeweils operativ verknüpft mit der kodierenden Sequenz. Unter einer operativen Verknüpfung versteht man die sequentielle Anordnung von Promotor, kodierender Sequenz, Terminator und gegebenenfalls weiterer regulativer Elemente derart, dass jedes der regulativen Elemente seine Funktion bei der Expression der 35 kodierenden Sequenz bestimmungsgemäß erfüllen kann. Beispiele für operativ verknüpfbare Sequenzen sind Targeting-Sequenzen sowie Translationsverstärker, Enhancer, Polyadenylierungssignale und dergleichen.

40 Zusätzlich zu den artifiziellen Regulationssequenzen kann die natürliche Regulationssequenz vor dem eigentlichen Strukturgen noch vorhanden sein. Durch genetische Veränderung kann diese natürliche Regulation gegebenenfalls ausgeschaltet und die Expression der Gene erhöht oder erniedrigt werden. Das Genkonstrukt kann 45 aber auch einfacher aufgebaut sein, das heißt es werden keine zusätzlichen Regulationssignale vor das Strukturgen insertiert und der natürliche Promotor mit seiner Regulation wird nicht ent-

## 5

fernt. Statt dessen wird die natürliche Regulationssequenz so mutiert, dass keine Regulation mehr erfolgt und die Genexpression gesteigert oder verringert wird. Die Nukleinsäuresequenzen können in einer oder mehreren Kopien im Genkonstrukt enthalten sein.

5

~~Beispiele für Promotoren sind: cos-, tac-, trp-, tet-, trp-tet-, lpp-, lac-, lpp-lac-, lacIq-, T7-, T5-, T3-, gal-, trc-, ara-, SP6-, kPR- oder im l-PR-Promotor, die vorteilhafterweise in gram-negativen Bakterien Anwendung finden; sowie die gram-positi-~~  
10 ~~ven Promotoren amy und SPO2, die Hefepromotoren ADC1, MFa, AC, P-60, CYC1, GAPDH oder die Pflanzenpromotoren CaMV/35S, SSU, OCS, lib4, usp, STLS1, B33, nos oder der Ubiquitin- oder Phaseolin-Promotor.~~

15 Prinzipiell können alle natürlichen Promotoren mit ihren Regulationssequenzen verwendet werden. Darüber hinaus können auch synthetische Promotoren vorteilhaft verwendet werden.

Die genannten regulatorischen Sequenzen sollen die gezielte Expression der Nukleinsäuresequenzen und der Proteinexpression ermöglichen. Dies kann beispielsweise je nach Wirtsorganismus bedeuten, dass das Gen erst nach Induktion exprimiert oder überexp-  
20 ~~primiert wird, oder dass es sofort exprimiert und/oder überexpri-~~  
miert wird.

25

Die regulatorischen Sequenzen bzw. Faktoren können dabei vorzugsweise die Expression positiv beeinflussen und dadurch erhöhen oder erniedrigen. So kann eine Verstärkung der regulatorischen Elemente vorteilhafterweise auf der Transkriptionsebene erfolgen,  
30 indem starke Transkriptionssignale wie Promotoren und/oder "Enhancer" verwendet werden. Daneben ist aber auch eine Verstärkung der Translation möglich, indem beispielsweise die Stabilität der mRNA verbessert wird.

35 Die Herstellung einer Expressionskassette erfolgt durch Fusion eines geeigneten Promotors mit einer geeigneten Monooxygenase-Nukleotidsequenz sowie einem Terminator- oder Polyadenylierungssignal. Dazu verwendet man gängige Rekombinations- und Klonierungstechniken, wie sie beispielsweise in T. Maniatis,  
40 E.F. Fritsch und J. Sambrook, "Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY (1989) sowie in T.J. Silhavy, M.L. Berman und L.W. Enquist, Experiments with Gene Fusions, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY (1984) und in Ausubel, F.M. et al.,  
45 Current Protocols in Molecular Biology, Greene Publishing Assoc. and Wiley Interscience (1987) beschrieben sind.

## 6

Das rekombinante Nukleinsäurekonstrukt bzw. Genkonstrukt wird zur Expression in einem geeigneten Wirtsorganismus vorteilhafterweise in einen wirtsspezifischen Vektor insertiert, der eine optimale Expression der Gene im Wirt ermöglicht. Vektoren sind dem Fachmann wohl bekannt und können beispielsweise aus "Cloning Vectors" (Pouwels P. H. et al., Hrsg, Elsevier, Amsterdam-New York-Oxford, 1985) entnommen werden. Unter Vektoren sind außer Plasmiden auch alle anderen dem Fachmann bekannten Vektoren, wie beispielsweise Phagen, Viren, wie SV40, CMV, Baculovirus und Adenovirus, Transposons, IS-Elemente, Phasmide, Cosmide, und lineare oder zirkuläre DNA zu verstehen. Diese Vektoren können autonom im Wirtsorganismus repliziert oder chromosomal repliziert werden.

Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vektoren sind rekombinante Mikroorganismen herstellbar, welche beispielsweise mit wenigstens einem erfindungsgemäßen Vektor transformierbar sind und zur Produktion der Mutanten eingesetzt werden können. Vorteilhafterweise werden die oben beschriebenen erfindungsgemäßen rekombinanten Konstrukte in ein geeignetes Wirtssystem eingebracht und exprimiert. Dabei werden vorzugsweise dem Fachmann bekannte geläufige Klonierungs- und Transfektionsmethoden verwendet, um die genannten Nukleinsäuren im jeweiligen Expressionssystem zur Expression zu bringen. Geeignete Systeme werden beispielsweise in Current Protocols in Molecular Biology, F. Ausubel et al., Hrsg., Wiley Interscience, New York 1997, beschrieben.

Als Wirtsorganismen sind prinzipiell alle Organismen geeignet, die eine Expression der erfindungsgemäßen Nukleinsäuren, ihrer Allelvarianten, ihrer funktionellen Äquivalente oder Derivate ermöglichen. Unter Wirtsorganismen sind beispielsweise Bakterien, Pilze, Hefen, pflanzliche oder tierische Zellen zu verstehen. Bevorzugte Organismen sind Bakterien, wie solche der Gattungen Escherichia, wie z. B. Escherichia coli, Streptomyces, Bacillus oder Pseudomonas, eukaryotische Mikroorganismen, wie Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus, höhere eukaryotische Zellen aus Tieren oder Pflanzen, beispielsweise Sf9 oder CHO-Zellen.

Gewünschtenfalls kann das Genprodukt auch in transgenen Organismen wie transgenen Tieren, wie insbesondere Mäusen, Schafen oder transgenen Pflanzen zur Expression gebracht werden. Bei den transgenen Organismen kann es sich auch um sogenannte Knock-Out Tiere oder Pflanzen handeln, in denen das korrespondierende endogene Gen ausgeschaltet wurde, wie z. B. durch Mutation oder partielle oder vollständige Deletion.

45

Gegenstand der Erfindung sind außerdem biochemische Verfahren zur enzymatischen Herstellung von terminal oder subterminal ( $\omega$ -1 bis  $\omega$ -4) hydroxylierten aliphatischen Carbonsäuren, die dadurch gekennzeichnet sind, dass man

5

a1) ~~einen erfindungsgemäßen rekombinanten Mikroorganismus in Gegenwart eines Kulturmediums, das wenigstens eine hydroxylierbare Carbonsäure oder wenigstens ein hydroxylierbares Carbonsäurederivat enthält, kultiviert; oder~~

10

a2) ein Reaktionsmedium, enthaltend wenigstens eine hydroxylierbare Carbonsäure oder wenigstens ein hydroxylierbares Carbonsäurederivat, mit einer erfindungsgemäßen Mutante inkubiert; und

15

b) das gebildete hydroxylierte Produkt oder Produktgemisch aus dem Medium isoliert.

~~Im erfindungsgemäßen Verfahren sind die Carbonsäuren per se, oder~~  
20 ~~Derivate davon, wie insbesondere  $C_1$ - $C_4$ -Alkylester oder Carbinsäureamide, einsetzbar.~~

~~Bevorzugt werden im erfindungsgemäßen Verfahren als hydroxylierbare Carbonsäure  $C_8$ - $C_{30}$ -Monocarbonsäuren oder Derivate davon ein-~~  
25 ~~setzt.~~

~~Besonders bevorzugt verwendet man im erfindungsgemäßen Verfahren als hydroxylierbare Carbonsäure eine  $C_8$ - $C_{12}$ -Monocarbonsäure oder ein Derivat davon und als Monooxygenase eine Mutante gemäß obiger~~  
30 ~~Gruppe (A).~~

Gemäß einem anderen erfindungsgemäßen Verfahren verwendet man als hydroxylierbare Carbonsäure eine  $C_{12}$ - $C_{30}$ -Monocarbonsäure oder ein Derivat davon und als Monooxygenase eine Mutante ausgewählt unter  
35 den Einfachmutanten F87A, F87V, V26T, S72G, A74G und M354T, und den Mehrfachmutanten f) bis i) gemäß obiger Gruppe (A) einsetzt.

Wird das Verfahren mit angereichertem oder gereinigtem Enzym durchgeführt, so werden beispielsweise folgende Reaktionsbedingungen  
40 eingestellt:

Substratkonzentration:	0,1 bis 20 mg/ml
Enzymkonzentration:	0,1 bis 10 mg/ml
45 Reaktionstemperatur:	20 bis 40 °C
pH:	6 bis 8



8

Puffer: 0,05 bis 0,2 M Kaliumphosphat,  
oder Tris/HCl  
Elektronendonator: wird bevorzugt portionsweise zu-  
gegeben (Anfangskonzentration  
etwa 0,1 bis 2 mg/ml).

5

Vor dem Start der Reaktion durch Zugabe der Elektronendonors kann zur Aktivitätssteigerung Aceton in einer Konzentration von 1 bis 5 % (v/v) zugegeben und kurzzeitig (1 bis 5 Minuten) vorinkubiert werden (bei etwa 20 bis 40 °C).

10

Der Fachmann kann, abweichend davon, durch routinemäßige Versuche die jeweiligen Reaktionsbedingungen optimieren.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird gewöhnlich in Gegenwart von  
Luftsauerstoff sowie in Gegenwart eines Elektronendonors (oder  
Reduktionsäquivalents), wie insbesondere NADH, NADPH und  
Zn/Co(III)sepulchrat, durchgeführt.

#### Detaillierte Beschreibung der Erfindung

20

Zur Erzeugung von Varianten mit modifizierten enzymatischen Eigenschaften stehen im Rahmen des Protein-Engineerings zwei unterschiedliche Strategien zur Verfügung: zum einen die Methode des "rationalen Designs" (4) sowie die Methode der "gezielten Evolution" (5-7). Für ein erfolgreiches rationales Design ist ein hochaufgelöstes dreidimensionales Strukturmodell sowie eine vertiefte Kenntnis des Enzymmechanismus von zentraler Bedeutung. Während für das rationale Design die Fähigkeit gezeigt wurde, Enzymmutanten zu erzeugen, welche hohe Aktivität gegenüber nicht-natürlichen Substraten besitzen (4) ist der Effekt punktförmiger einzelner Aminosäuresubstitutionen auf die Stabilität, Aktivität und Spezifität der Mutanten häufig nicht vorhersagbar.

Obwohl Röntgenstrukturen von P450 BM-3 in der Protein-Data Bank (8) hinterlegt wurden, ist die Konformation von Substrat und P450 während des kritischen Hydroxylierungsschrittes weiterhin unklar (9-11). Für die Methode der gezielten Evolution ist eine effiziente Nachweismethode für ein schnelles Screening großer Bibliotheken von Zufallsmutanten von zentraler Bedeutung. Ein optischer Test für die P450 BM-3-Mutante F87A, welche  $\omega$ -para-Nitrophenoxy-carbonsäuren (pNCA) verwendet, hat sich als brauchbar erwiesen (12, 13). Die Einzelmutante F87A verschiebt die Hydroxylierungsposition von Fettsäuren von der Position  $\omega$ -1,  $\omega$ -2 und  $\omega$ -3 in Richtung der  $\omega$ -Position (13) und führt außerdem zu einer vollständigen Umwandlung von 12-pNCA im Vergleich zu einer 33 %igen Umwandlung, welche man für das Wildtyp-Enzym beobachtet (12). Da jedoch die Monooxygenase-Domäne von P450 BM-3 mehr als 400 Amino-

säuren umfasst, kommt das Screening einer Bibliothek von Zufallsmutanten der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen gleich.

Zur Verbesserung der Effizienz der Suchprozedur wurde erfindungs-  
5 gemäß das Verfahren des rationalen Designs mit dem Verfahren der  
~~gezielten Evolution kombiniert, um Mutanten mit modifizierter~~  
~~Reaktivität, insbesondere zur Erzeugung von Mutanten mit Spezifi-~~  
~~tät für Fettsäuren mittlerer Kettenlänge, zu erzeugen.~~ Die erfin-  
dungsgemäße Methode der "rationalen Evolution" basiert auf einem  
10 Computer-unterstützten Protein-Modeling, um eine virtuelle Zu-  
falls-Bibliothek zu erzeugen und um Reste zu identifizieren, die  
mit hoher Wahrscheinlichkeit die gewünschten Eigenschaften beein-  
flussen. Eine Unter-Bibliothek wird durch Randomisierung dieser  
Reste erzeugt und auf positive Mutanten gescreent. Ausgehend von  
15 einem Strukturmodell beginnt man mit der Bestimmung von Resten,  
welche möglicherweise für die Kettenlängenspezifität von Bedeu-  
tung sind. Zur Erzeugung von Mutanten mit verbesserten Eigen-  
schaften wird die durch das Modell vorgeschlagene Mutationsstelle  
mit Hilfe der Sättigungsmutagenese modifiziert. Anschließend werden  
20 dann die Einzelmutanten mit den besten Eigenschaften unter Be-  
rücksichtigung des rationalen Designs miteinander kombiniert. Un-  
ter Anwendung dieser kombinierten Strategie konnten insbesondere  
die Aktivität von P450 BM-3 für Substrate mittlerer Kettenlänge  
verbessert werden.

25

Unter Anwendung dieser Strategie und aufgrund der Sequenzhomolo-  
gie zu P450-Enzymen anderen Ursprungs wird es dem Fachmann ermög-  
licht in analoger Weise weitere Mutanten herzustellen, welche  
ebenfalls Gegenstand der Erfindung sind.

30

Die vorliegende Erfindung wird nun durch folgende Beispiele und  
unter Bezugnahme auf beiliegende Figuren näher erläutert. Dabei  
zeigt:

35 Figur 1 die schrittweise Optimierung von P450 BM-3 für das neue  
Substrat 8-pNCA. Die katalytische Effizienz gegenüber 8-pNCA ist  
für jede Mutante (in der Einheit  $s^{-1}M^{-1}$ ) angegeben; und

Figur 2 ein Modell des Komplexes der P450 BM-3-Mutante LARVF mit  
40 dem Substrat 8-pNCA. Die Seitenketten, welche die fünf besten  
Mutationspositionen aufweisen und die zur Mutante LARVF kombi-  
niert wurden, sind dargestellt (V26T, R47F, A74G, F87V, L188K).

45 Methode 1: Modellierung des Substrat-P450 BM-3-Komplexes

## 10

Die Modellierung des Substrat-Enzym-Komplexes basierte auf der kristallographisch bestimmten Struktur von P450 BM-3, komplexiert mit Palmitoleinsäure (9). Diese Struktur ist bei der Protein-Data Bank hinterlegt (8). Die beschriebene Kristallstruktur mit einer

5 Auflösung von 2,9 Å enthält vier Moleküle in einer asymmetrischen Einheitszelle. Kette A wurde als Referenz für den modellierten Komplex ausgewählt. Als Substratmolekül wurde ein Modell von 8-pNCA unter Verwendung des "Molecule Builder" von SYBYL (Tripos, Inc., St. Louis, USA) erzeugt. Die F87A-Mutation wurde unter Ver-

10 wendung des Biopolymer-Tools von SYBYL erzeugt. Die C-Atome 1 bis 4 des Substrats wurden in die Bindungsstelle entsprechend den C-Atomen 6 bis 9 der gebundenen Palmitoleinsäure platziert. Die Torsionswinkel der Fettsäurekette wurden entsprechend der Trans-Konfiguration gewählt. NMR-Untersuchungen für P450 BM-3-Laurat- und

15 -12-Bromlaurat-Komplexe zeigten, dass die Protonen der hydroxylierten C-Atome (C10 und C11) etwa 3,0 Å vom Häm-Eisen in der Oxidationsstufe II entfernt sind (10, 13). Auf der Basis dieses Ergebnisses wurden die entsprechenden Atome C7 und C8 von 8-pNCA in einem Abstand von 4 Å bzw. 3,6 Å vom Häm-Eisen platziert. Die

20 para-Nitrophenoxygruppe wurde manuell in der Bindungstasche angeordnet. Außerdem wurde die Energie des Komplexes über fixierte Backbone-Atome minimiert.

Methode 2: Sättigungsmutagenese

25

Die erfindungsgemäß verwendeten Mutanten wurden mit Hilfe der Sättigungsmutagenese unter Verwendung des Stratagene QuikChange Kit (La Jolla, Kalifornien, USA) hergestellt. Neun Positionen in der Umgebung des Substrat-Bindungskanal, und zwar P25, V26, R47,

30 Y51, S72, A74, F87, L188 und M354, wurden für die Mutation über das P450 BM-3-Modeling ausgewählt. Die Primer für jede dieser Positionen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1:

35

	ausgewählte Positionen	Primer	Sequenz Nr.
40	P25	5'-gttattaaacacagataaannngttcaagctttgatg-3' 5'-catcaaagcttgaacnnntttatctgtgtttaataac-3'	SEQ ID NO: 9 SEQ ID NO: 10
	V26	5'-gttattaaacacagataaaccgnnncaagctttgatg-3' 5'-catcaaagcttgnnncggtttatctgtgtttaataac-3'	SEQ ID NO: 11 SEQ ID NO: 12
	R47	5'-cgaggcgcttggtnnngtaacgcgctacttadc-3' 5'-gataagtagcgcggttacnnnaccaggcgctcg-3'	SEQ ID NO: 13 SEQ ID NO: 14
	45 Y51	5'-cctggtcgtgtaacgcgcnnnttatcaagtcagc-3' 5'-gctgacttgataannngcgcggttacacgaccagg-3'	SEQ ID NO: 15 SEQ ID NO: 16

5	S72	5'-gctttgataaaaacttannncaagcgcttaaatttgtagc-3'	SEQ ID NO: 17
		5'-cgtacaaatttaagcgcttgnnntaagtttttatcaaagc-3'	SEQ ID NO: 18
10	A74	5'-gctttgataaaaacttaaagtcaannncttaaatttgtagc-3'	SEQ ID NO: 7
		5'-cgtacaaatttaagnnnttgacttaagtttttatcaaagc-3'	SEQ ID NO: 8
15	L188	5'-gaagcaatgaacaagnnncagcgagcaaatccag-3'	SEQ ID NO: 5
		5'-ctggatttgctcgctggnncttggttcattgcttc-3'	SEQ ID NO: 6
20	M354	5'-ggcgacgaactannngttctgattcctcag-3'	SEQ ID NO: 19
		5'-ctgaggaatcagaacnnntagttcgctgcc-3'	SEQ ID NO: 20
25	F87	5'-gcaggagacgggggtgnnnacaagctggacg-3'	SEQ ID NO: 3
		5'-cgtccagcttgtnnncaaccccgctctcctgc-3'	SEQ ID NO: 4

Die Reaktionsbedingungen waren für alle mutagenen PCR-Verfahren identisch, mit Ausnahme der Annealing-Temperatur, welche in folgender Weise variiert wurde: 50 °C für die Positionen 25, 26, 188 und 354; 52 °C für die Positionen 47 und 51; und 46 °C für die Positionen 72, 74 und 87. Die Reaktionen wurden in 50 µl Reaktionsvolumen durchgeführt, wobei jeder Ansatz 17,5 pmol jedes Primers, 20 pmol der Template-Plasmid-DNA, 3 U der Pfu-Polymerase und 3,25 nmol jedes dNTP enthielt. Die Reaktion wurde bei 95 °C, 4 Minuten, gestartet, anschließend wurde 20-mal folgender Thermocyclus durchlaufen: 95 °C, 1 Min.; 46-52 °C, 2,5 Min.; 72 °C, 17 Min.; nach diesen 20 Zyklen wurde die Reaktion 15 Minuten bei 72 °C fortgesetzt. Für die ortsspezifische Mutagenese durch PCR wurde ein Einzelcodon für den Austausch einer Aminosäure verändert. Für die Randomisierung einer spezifischen Aminosäure wurden Primer verwendet, in denen "nnn" für die spezifische Aminosäure codiert. Alle PCR-Produktlösungen wurden mit 20 U DpnI bei 37 °C über 3 Stunden behandelt, um die ursprüngliche, nicht-mutierte Template-DNA zu verdauen. Anschließend erfolgte die Transformation in E. coli DH5α.

### Methode 3: Expression und Reinigung von Wildtyp-Enzym sowie der Mutanten

Das P450 BM-3-Wildtyp-Gen und dessen Mutanten wurden unter der Kontrolle des starken, temperatur-induzierbaren  $P_{RPL}$ -Promotors pCYTEXP1 in E. coli Stamm DH5α (supE44, lacU169 [80lacZ M15] hsdR17<sup>-</sup>recA1 endA1.gyrA96 thi-1 relA1) exprimiert. Die einzelne Punktmutation F87A wurde, wie aus dem Stand der Technik bekannt (12), eingeführt. Die transformierten Zellen wurden auf LB-Agarplatten ausplattiert, welche 100 µg/ml Ampicillin enthielten. Nach 12- bis 24-stündigem Wachstum wurden die Kolonien mit sterilen Zahnstochern aufgenommen und in Mikrotiterplatten mit 96 Vertiefungen plaziert, wobei jede Vertiefung 200 µl TB-Medium (12 g Tryptophan, 24 g Hefeextrakt, 4 ml Glyzerin, H<sub>2</sub>O (dest.) ad. 1 Liter) mit 100 µg/ml Ampicillin enthielt. Die Platten wurden über

## 12

- Nacht bei 37 °C inkubiert. Anschließend wurden 40 µl aus jeder Vertiefung entnommen und in Kulturröhrchen überführt, welche 2 ml TB-Medium mit 100 µg/ml Ampicillin enthielte, und anschließend wurde 2 Stunden bei 37 °C und dann 6 Stunden bei 42 °C inkubiert.
- 5 Die Zellen wurden bei 4000 Upm 5 Minuten abzentrifugiert, mit Lysozym aus Hühnereiweiß (1 U/ml) behandelt und dann zweimal gefroren und aufgetaut. Die Zell-Rohextrakte erhielt man durch 10-minütige Zentrifugation bei 14000 Upm. Der so erhaltene Überstand wurde für die Aktivitätsmessung eingesetzt. Zur Herstellung gro-
- 10 ßer Enzymmengen wurde ein 2 l-Schüttelkolben mit 300 ml TB-Medium mit 100 µg/ml Ampicillin verwendet, bei 37 °C inkubiert und 2 Stunden bei 200 Upm geschüttelt ( $OD_{578nm} = 0,8$  bis 1,0) und anschließend 6 Stunden bei 42 °C inkubiert. Die Zellen wurden durch 10-minütige Zentrifugation bei 4000 Upm gesammelt und in 15 ml
- 15 0,1 M Kaliumphosphat-Puffer, pH 7,4 suspendiert. Die eisgekühlte Suspension wurde mit Hilfe eines Branson Sonifiers W25 (Dietzenbach, Deutschland) (80 W, 2 Minuten, 3 Cyclen) aufgeschlossen. Die Suspension wurde 20 Minuten bei 32570 x g zentrifugiert. Die Rohextrakte wurden zur Bestimmung der Enzymaktivität oder zur En-
- 20 zymreinigung verwendet.

- Die Enzymreinigung wurde wie in (14) beschrieben, durchgeführt, wobei jedoch eine BioPilot-Chromatographieanlage (Pharmacia, Schweden) verwendet wurde. Die Reinheit des Enzyms wurde durch
- 25 Bestimmung des Gesamtproteins sowie der Menge des Enzyms festgestellt. Die Konzentration an gereinigtem Enzym wurde über die Differenz zwischen dem Extinktionsspektrums des Carbonylkomplexes der Eisen-(II)-form im Vergleich zur Eisen-(II)-form unter Verwendung einer molekularen Absorptivität von  $91 \text{ mM}^{-1} \text{ cm}^{-1}$  für das
- 30 Wellenlängenpaar 450 nm und 490 nm bestimmt (1).

Methode 4: Isolierung von Mutanten mit höherer Aktivität für Substrate kürzerer Kettenlänge

- 35 Die Mutante F87A von P450 BM-3 wurde anstelle des Wildtyps als Template-DNA verwendet. Die Mutationen für die jeweilige Position wurden wie oben beschrieben hergestellt. Jeweils etwa 100 Kolonien wurden zur Durchmusterung des Sequenzraumes an jeder Position gepickt, in Kulturröhrchen kultiviert und Zellen wurden da-
- 40 raus isoliert und lysiert. Die Zell-Rohextrakte einer jeden ausgewählten Kolonie wurden für den Aktivitätstest verwendet. Sämtliche Mutanten, die im Vergleich zu F87A eine höhere Aktivität für wenigstens ein Substrat mit einer kürzeren Kettenlänge als 15-pNCA zeigten, wurden zur Bestimmung der Mutationen sequen-
- 45 ziert.

## 13

Die Mutante mit der jeweils höchsten Aktivität für 12-pNCA, 10-pNCA oder 8-pNCA von allen Mutanten für die gleiche Position wurde für eine spätere Kombination mit anderen Mutationen ausgewählt. Die kombinierte Mutation wurde schrittweise durch ortsspezifische Mutagenese ausgeführt. Der Kombinationsweg ist in Figur 5 dargestellt. Sechs Kolonien wurden für jeden Kombinations-schritt für die Bestimmung der Substratspezifität isoliert. Eine Kolonie mit repräsentativer Substratspezifität wurde ausgewählt und die Substratspezifität wurde für das reine Enzym bestimmt.

10 Das Plasmid der ausgewählten Kolonie wurde für den nächsten Schritt der ortsspezifischen Mutagenese verwendet. Die Mutationen in der Endmutante wurden durch DNA-Sequenzierung bestimmt (ABI PRISM<sup>®</sup> BigDye<sup>™</sup> Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit und ABI Prism<sup>™</sup> 377 DNA Sequencer).

15

Methode 5: Enzym-Aktivitätstest

Für den pNCA-Aktivitätstest wurden 8 µl einer 10 mM pNCA-Lösung in DMSO in einer Einwegküvette in einem Endvolumen von 1 ml durchgeführt. Nach Zugabe von 850 µl Tris/HCl-Puffer (0,1 M, pH 8,2) und 0,1 bis 0,4 nmol P450 zu der jeweiligen pNCA-DMSO-Lösung wurden die Proben 5 Minuten vorinkubiert, bevor die Reaktion durch Zugabe von 50 µl einer wässrigen Lösung von 1 mM NADPH gestartet wurde. Zur Bestimmung von  $K_{cat}$  und  $K_m$  wurde eine Konzentrationsreihe für die verschiedenen pNCA-Substrate erstellt (bezüglich Details des Nachweisverfahrens kann auf (12) verwiesen werden).

20

25

Zur Durchführung des pNCA-Tests in einer Mikrotiterplatte wurde eine Platte mit 96 Vertiefungen (Greiner, Frickenhausen, Deutschland) verwendet. Der Reaktionsansatz enthielt in einem Gesamtreaktionsvolumen von 250 µl in Tris/HCl-Puffer (0,1 M, pH 8,2) entweder 60 nmol 8-pNCA, 15 nmol 10-pNCA, 15 nmol 12-pNCA oder 15 nmol 15-pNCA, jeweils gelöst in 2,5 µl DMSO. Nach 5-minütiger Vorinkubation mit 40 µl P450 BM-3-Proben wurde die Reaktion durch Injektion von 30 µl einer 1 mM NADPH-Lösung in jede Vertiefung gestartet. Die Platten wurden unmittelbar nach Zugabe der NADPH-Lösung auf einem Platten-Lesegerät bei 405 nm vermessen.

30

35

40 Methode 6: Umsetzung von Carbonsäuren mit erfindungsgemäßen Mutanten und Bestimmung der Produkte

a) Chemische Reaktion

45 Für die Hydroxylierung der Fettsäuren in Anwesenheit von P450 BM-3 bzw. seiner Mutanten wurde folgender Ansatz gewählt:

## 14

P450 BM-3-Mutante 20 mg  
Reaktionspuffer 20 ml (Tris/HCl 50mM, KCl 250mM, pH 7,8)  
Fettsäure 10 mg  
Aceton 400 µl (2 % v/v) (beschleunigt Reaktion um  
Faktor 2)

5

Das Enzymlyophilisat wurde vor der Reaktion in 1 ml Reaktionspuffer gelöst und zunächst 30 min bei 36 °C inkubiert. Die Inkubation führt wie die Zugabe von 2 Vol.-% Aceton zu einer Aktivitätssteigerung von 60 bzw. 75 %.

10

Nach 5-minütiger Inkubation erfolgte die Zugabe von 500 µl der vorbereiteten NADPH-Lösung (12,5 mg/ml). Der Verlauf der Reaktion wurde durch Absorptionsmessungen bei 340 nm verfolgt, wobei der Verbrauch von NADPH beobachtet werden kann. Für eine stöchiometrische Umsetzung wären theoretisch 4 ml NADPH-Lösung notwendig, eine zu hohe Konzentration an NADPH in der Reaktionslösung führt jedoch zur Inaktivierung des Enzyms, deshalb wird der Cofaktor in 500 µl-Schritten zugegeben.

15

Nach Beendigung der Reaktion wurde die Lösung mit 5M Salzsäure bis zu einem pH-Wert von 2 angesäuert. Dabei fallen die Fettsäuren bzw. hydroxylierten Fettsäuren aus und führen zu einer sichtbaren Trübung der Lösung. Danach wurde zweimal mit je 10 ml Dichlormethan extrahiert und über Natriumsulfat getrocknet. Nach der Filtration über einen Faltenfilter erfolgte die Entfernung des Dichlormethans am Rotationsverdampfer oder durch Eindampfen mit Stickstoff. Der verbliebene weiße Feststoff wurde dann wieder in 2 ml Dichlormethan aufgenommen und für die GC-Analyse verwendet.

20

## 30 b) Gaschromatographische Analyse

Für die Analyse wurde ein Fisons Gaschromatograph (Fisons Instruments Mega Series, Mainz, Deutschland) mit FID verwendet (Optima 5-Säule, 25 m x 0,25 mm ID, Macherey & Nagel, Düren, Deutschland).

25

Zur Analyse wurden Edukte und Produkte mit MSHFBA silyliert. Dabei werden alle Hydroxyl- und Säuregruppen in die entsprechenden Trimethylsilylether bzw. -ester umgewandelt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Probe wasserfrei ist, da es sonst zu Nebenreaktionen mit dem Silylierungsagens kommt. Zu 10 µl der hydroxyfettsäurehaltigen Dichlormethan-Lösung wurden 15 µl MSHFBA pipettiert und 15 min bei Raumtemperatur inkubiert. Nach Zugabe von 25 µl Dichlormethan erfolgte die GC-Analyse.

35

40

45

## 15

Dazu wurde 1 µl der silylierten Proben in den Gaschromatographen eingespritzt. Injektor- und Detektortemperatur lagen bei 350 °C. Folgende Temperaturprogramme wurden verwendet:

## 5 Caprylsäure

100 °C (2 min)  $\xrightarrow{50^\circ/\text{min}}$  200 °C  $\xrightarrow{10^\circ/\text{min}}$  300 °C (5 min)

## Caprinsäure

10 100 °C (2 min)  $\xrightarrow{5^\circ/\text{min}}$  140 °C (5 min)  $\xrightarrow{10^\circ/\text{min}}$  300 °C (5 min)

## Laurinsäure

100 °C (2 min)  $\xrightarrow{5^\circ/\text{min}}$  170 °C (5 min)  $\xrightarrow{10^\circ/\text{min}}$  300 °C (5 min)

15

Beispiel 1: Selektion der Anfangsmutante

Die Einzelmutante F87A von P450 BM-3 wurde als Ausgangs-Template  
20 verwendet. Wie bereits erwähnt, wird durch diese Mutation die Hydroxylierungsposition in gesättigten C12- und C14-Fettsäuren von  $\omega$ -1,  $\omega$ -2 und  $\omega$ -3 in Richtung der  $\omega$ -Position verschoben (13). Für die Umsetzung von 12-pNCA und 15-pNCA wurde ebenfalls gezeigt, dass die  $\omega$ -Hydroxylierung im Vergleich zum Wildtyp signifikant  
25 verstärkt wird (12). Für die  $\omega$ -Hydroxylierung von 12-pNCA erhielt man eine vollständige Umwandlung, verglichen mit einer 33 %igen Umwandlung für den Wildtyp. Zusätzlich zur erhöhten Regioselektivität beobachtete man auch erhöhte Aktivitäten für 12-pNCA und 15-pNCA (vergleiche Tabelle 2).

30

Tabelle 2: Spezifische Aktivität ausgewählter P450 BM-3-Mutanten für verschiedene pNCA-Derivate mit unterschiedlicher Kettenlänge<sup>1</sup>

35

Sub- strat	WT	F87A	L188K	V26T	R47F	S72G	A74G	M354T
15-pNCA	405	410	288	519	258	439	474	560
12-pNCA	141	284	316	555	233	596	517	480
10-pNCA	339	92	207	106	52	150	103	171
40 8-pNCA	15	2	69	16	13	3	6	4

<sup>1</sup> Einheiten spezifischer Aktivität: nmol/min/nmol P450

Die erhöhte Regioselektivität von F87A ist anhand des Strukturmodells verständlich. Die Substitution des sperrigen Restes F87  
45 durch Alanin vergrößert die Bindungstasche für die p-Nitrophenoxygruppe, welche durch F87, außerdem durch V78, A82, T260, I263 und A264 gebildet wird. Außerdem wird der Zugang der großen p-Ni-



trophenoxygruppe zur Bindungstasche erleichtert und die sterischen Wechselwirkungen zwischen F87 und den C-Atomen  $\omega-2$  und  $\omega-1$  der pNCA werden eliminiert. Dies ermöglicht eine vorteilhaftere Orientierung der  $\omega$ -Position gegenüber dem Häm-Eisenatom.

5

Beispiel 2: Selektion einzelner Mutationspositionen durch Modeling, ortsspezifische Randomisierungsmutagenese ausgewählter Positionen und Screening

10 1. Selektion der Mutationspositionen

Das Modell des gebundenen C8-pNCA-Substrats zeigt, dass sich das Carboxylat in einem Abstand von 9 und 11 Å zu den Carboxylat-bindenden Resten R47 bzw. Y51 befindet. Um Aktivität gegenüber

- 15 C8-Substraten zu induzieren, ist es erforderlich, eine neue Bindungsstelle zu erzeugen, welche sich in geeigneter Distanz zur Carboxylatgruppe des Substrats befindet. Zur Erleichterung der Bindung von 8-pNCA sollten zusätzliche Reste innerhalb der Bindungsstelle positioniert werden. Folgende Reste wurden ausgewählt:
- 20 Die Reste R47 und Y51, welche die ursprüngliche Carboxylat-Bindungsstelle bilden. Für R47 wird die Bildung eines Ionenpaares zwischen dessen Guanidiniumgruppe und dem Carboxylatrest des Substrats vorgeschlagen; Y51 bildet eine H-Brücke mit der Carboxylatgruppe des Substrats (9). Für den Palmitoleinsäure/P450
- 25 BM-3-Komplex beträgt die Distanz zwischen dem C $\alpha$ -Atom von R47 und dem C-Atom der Fettsäurecarboxylatgruppe 12 Å. Sämtliche Reste in der Hemisphäre mit einem 12 Å-Radius um die Carboxylatgruppe des 8-pNCA-Modells wurden bestimmt und nur solche innerhalb der Bindungstasche mit Seitenketten, die in Richtung der Carboxylat-
- 30 gruppe der Fettsäure weisen, wurden ausgewählt. So wurden P25, V26, S72, A74, L188 und M354 ausgewählt, welche wahrscheinlich eine neue Carboxylat-Bindungsstelle für kurzkettige pNCA-Verbindungen ausbilden könnten. Diese sechs ausgewählten Reste befinden sich auf sekundären Strukturelementen mit flexibler Konformation
- 35 (11).

---

2. Mutation und Screening

- Mutanten von jedem der acht ausgewählten Reste wurden durch ortsspezifische Randomisierung des Wildtyp-Codons an den entsprechenden Positionen erzeugt. Um sicherzustellen, dass die meisten der
- 40 19 möglichen Arten von Aminosäuren getestet werden, wurden 100 Kolonien einer jeden Position isoliert, kultiviert und auf Aktivität getestet. (Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit, jede Amino-
- 45 säure zu testen, mehr als 95 %, ausgenommen einer Wahrscheinlichkeit von 79 % für Tryptophan und Methionin). Die Mutanten mit einem höheren Aktivitätswert für wenigstens ein Substrat mit kür-

zerer Kettenlänge als 15-pNCA wurden für die Sequenzierung zur Bestimmung der Mutation (Mutationen) ausgewählt.

Es zeigte sich, dass Position 188 relativ variabel ist. Die meisten der 100 Kolonien zeigten Aktivität für pNCA. Daraus wurden entsprechend ihrer Aktivität gegenüber 8-pNCA 37 Kolonien ausgewählt. 16 verschiedene Aminosäuretypen, einschließlich dem Wildtyp, wurden detektiert. Dieses Ergebnis bestätigte außerdem, dass die Auswahl von 100 Kolonien ausreichend war, um sicherzustellen, dass die meisten der 20 möglichen Aminosäuren getestet werden können. Von den 15 Substitutionen erhöhten die Substitutionen K, R, W, Q, N, G, A und S signifikant die katalytische Aktivität für Substrate mit kürzerer Kettenlänge. Die Substitution von L durch negativ geladene Aminosäuren führte zu einer Verringerung der Aktivität gegenüber 10-pNCA, 12-pNCA und 15-pNCA um das Drei- bis Siebenfache.

Die anderen sieben Positionen wurden in ähnlicher Weise wie Position 188 randomisiert. Von jeder Position wurden 7 bis 19 Kolonien für die DNA-Sequenzierung zum Nachweis der Mutation (Mutationen) ausgewählt. Die meisten dieser Gene waren entweder nicht mutiert oder das Genprodukt zeigte eine verringerte Aktivität für Substrate kürzerer Kettenlänge (Tests wurden mit reinem Enzym durchgeführt). Jeweils nur eine Mutante der Positionen 26, 47, 74 und 354, zwei Mutanten der Position 72 und keine Mutante der Positionen P25 und Y51 zeigte im Vergleich zu 15-pNCA für Substrate kürzerer Kettenlänge eine höhere Aktivität. Die Mutante mit der höchsten Aktivität für 8-pNCA in Position 188 und Position 72 sowie sämtliche Einzelmutanten der Positionen 26, 47, 74 und 354 wurden für eine Kombination ausgewählt. Diese Mutationen, welche in obiger Tabelle 2 aufgelistet sind, enthalten folgende Substitutionen: V26T, R47F, S72G, A74G, L188K und M354T. Im Vergleich zu F87A erhöhte sich die spezifische Aktivität gegenüber 8-pNCA um den Faktor 0,5 bis 33,5. Jede dieser Mutationen wurde mit der Ursprungsmutation F87A schrittweise kombiniert.

---

### Beispiel 3: Mehrfachmutanten, hergestellt durch schrittweise Kombination von Mutanten und deren Screening

#### 1. Mutante L (F87A, L188K)

Die Auswahl der ersten Mutante ist kritisch, da die Kombination von Einzelmutanten nicht notwendigerweise in einer Kumulation der Einzeleffekte resultiert. Eine falsche Auswahl der ersten Mutation könnte in die Richtung eines Evolutionsweges lenken, der nicht zu einer optimalen Mehrfachmutation führt. Im Falle eines großen Ausgangspools von Einzelmutanten ist daher eine enorme

kombinatorische Vielfalt wahrscheinlich, und das Auffinden der gewünschten Mehrfachmutante ist folglich unwahrscheinlich.

Zwei Kriterien sprechen für die Auswahl der Mutante L als Ausgangspunkt: deren erhöhte Aktivität gegenüber 8-pNCA im Vergleich zu allen anderen Mutanten (Tabelle 2) sowie die Veränderungen in der Enzym-Substratwechselwirkung und den Eigenschaften der Bindungsstelle. Zur Verifizierung dieser Veränderungen wurden Strukturmodelle der ausgewählten Mutanten dadurch erzeugt, dass man die Seitenketten der Mutationspositionen mit Hilfe der SYBYL-Methode ersetzte. L188 ist am C-Terminus der  $\alpha$ -Helix F lokalisiert. Diese Helix und die benachbarten G Helices erfahren die größte Verschiebung durch eine Substratbindung (9). Das Modell veranschaulicht, dass ein Austausch von Leucin durch Lysin zur Bildung einer neuen putativen Carboxylat-Bindungsstelle führt. Der Abstand zwischen der Aminogruppe von K188 und dem Carboxylatrest von 8-pNCA beträgt 6 Å und ist somit vergleichbar mit dem experimentell bestimmten Abstandswert für die Carboxylatgruppe der Palmitoleinsäure und der Guanidiniumgruppe von R47 (dem ursprünglichen Bindungsrest). Die Distanz zwischen der Guanidiniumgruppe von R47 und der Carboxylatgruppe von 8-pNCA beträgt 11,4 Å. Es kann daher vorgeschlagen werden, dass die Ionenpaar-Wechselwirkungen zwischen der Carboxylatgruppe des Substrates und K188 zusammen mit dem hydroxylierten C8-Atom in reaktiver Distanz zum Häm-Eisenatom erfolgen.

Die anderen fünf Mutanten wurden schrittweise mit der Mutante L durch ortsspezifische Mutagenese kombiniert (vergleiche Figur 1). Für jeden Mutagenese-Schritt wurde ein Strukturmodell der selektierten Mutanten erzeugt. Anhand dieses Modells wurden die Einflüsse der erzeugten Mutanten auf die Substratbindung untersucht und eine rationale Erklärung für die optimierten Eigenschaften der Mutanten und ihrer Kombinationen wurde davon ausgehend vorgeschlagen.

35

## 2. Mutante LA (F87A, L188K, A74G)

Die katalytische Effektivität gegenüber 8-pNCA erhöhte sich durch Einführung der Mutation A74G in die Mutante L. A74 befindet sich am N-Terminus der  $\alpha$ -Helix B'. Da die Seitenkette von A74 sterisch mit der Aminogruppe von K188 interagiert, wird durch einen Austausch von A74 durch Glycin diese Wechselwirkung eliminiert, wodurch eine vorteilhaftere Orientierung der Seitenkette gegenüber der Carboxylatgruppe des Substrats ermöglicht wird.

45

## 3. Mutante LAR (F87A, L188K, A74G, R47F)

## 19

Die Verbesserung der katalytischen Effizienz für 8-pNCA gelang durch Einführung der zusätzlichen Mutation R47F. Die Mutation R47F hat zwei mögliche Effekte. Phenylalanin behindert die ursprüngliche Carboxylatbindung und vergrößert den dem Lösungsmittel ausgesetzten hydrophoben Abschnitt am Eingang des Bindungskanals, ~~der von den Resten F11, L14, L17, P18, P45 und A191 gebildet wird~~ (vergleiche Figur 2). Dieser hydrophobe Abschnitt ist von besonderer Bedeutung für die Substratanbindung (11).

## 10 4. Mutante LARV (F87A, L188K, A74G, R47F, V26T)

Wird die Mutation M354T der Mutante LAR hinzugefügt, so verringert sich Kcat für 8-pNCA. M354T wurde deshalb aus weiteren Kombinations-Versuchen ausgeklammert. Fügt man jedoch die Mutation V26T der Mutante LAR zu, so zeigt die resultierende Mutante LARV einen geringfügig höheren Kcat-Wert und einen geringfügig geringeren Km-Wert als LAR. Die katalytische Effizienz gegenüber 8-pNCA erhöhte sich. Wird statt dessen die Mutation S72G in der Mutante LAR durchgeführt, so verringerte sich Kcat für 8-pNCA. Aus diesem Grund wurde die Mutante LARV für weitere Mutationen ausgewählt.

V26 ist am N-Terminus der  $\alpha$ -Helix A lokalisiert. Das Modell weist darauf hin, dass T26 die Rolle des ursprünglichen Restes Y51 der Bindungsstelle übernehmen könnte und die Carboxylatgruppe des Substrates durch Ausbildung einer H-Brücke stabilisieren könnte. Der Abstand zwischen der Hydroxylgruppe von T26 und der Aminogruppe von K188 beträgt 6,9 Å. Verglichen mit der ursprünglichen Bindungsstelle ist dieser Abstand um etwa 2 Å größer (4,8 Å zwischen der Hydroxygruppe von Y51 und der Guanidiniumgruppe von R47). Es besteht somit die Möglichkeit, dass die K188-haltige F-Helix weiteren Konformations-Änderungen unterzogen wird, aufgrund derer 8-pNCA tiefer in der Bindungsregion festgehalten wird und die Distanz zwischen T26 und K188 verringert wird.

35

## 5. Mutante LARVF (F87V, L188K, A74G, R47F, V26T)

Es konnte gezeigt werden, dass Position 87 von besonderer Bedeutung für die katalytische Aktivität und die Substratspezifität des Enzyms ist (3, 13). Die Mutante LARV wurde deshalb in Position 87 durch ortsspezifische randomisierte Mutagenese optimiert. Von 100 Kolonien wurde eine Mutante erhalten, welche eine katalytische Effizienz von  $3,5 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1} \text{ M}^{-1}$  gegenüber 8-pNCA zeigte. Die DNA-Sequenzdaten ergaben, dass Alanin in Position 87 durch Valin ersetzt war.

## 20

Aus der Kristallstruktur (11) und früheren Experimenten (3, 13) ist bekannt, dass R87 wichtig für den Zugang des Substrates zum Häm-Eisen ist. Die sperrige para-Nitrophenylgruppe dieses Substrats machte es notwendig, die Größe der Bindungsstelle durch den Austausch von Phenylalanin durch Alanin zu erhöhen. Durch den Austausch von A87 durch Valin wird der Kontakt von C<sub>ω</sub> mit dem Häm-Eisenatom aufgrund sterischer Wechselwirkungen zwischen dem Ethersauerstoff und der Seitenkette von V87 verbessert.

- 10 Die Daten zeigen, dass zwei Schlüsselschritte, F87A zu L und LARV zu LARVF, die katalytische Effizienz gegenüber 8-pNCA erhöhten. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die anderen Mutationen in der Mutante LARVF wieder rückgängig gemacht werden können, ohne die Aktivität für 8-pNCA zu verlieren. Deshalb wurden Mutanten  
15 hergestellt, die statt der Mutation F87A die Mutation F87V enthalten. Diese Mutanten tragen folgende Bezeichnungen:

- 1.) L7V mit den Mutationen F87V L188K
- 2.) AL7V mit den Mutationen F87V L188K A74G
- 20 3.) ARL7V mit den Mutationen F87V L188K A74G R47F

Bei den Aktivitätstests wurden folgende Ergebnisse erhalten:

Tabelle 3: Kinetische Parameter von P 450 BM-3-Mutanten für pNCA-  
25 Derivate unterschiedlicher Kettenlänge, ermittelt bei pH 8,0 und 25 °C

	Kcat (s <sup>-1</sup> )			Km (μM)			Kcat/Km (s <sup>-1</sup> M <sup>-1</sup> )		
	12	10	8	12	10	8	12	10	8
30 F87V	0,7	1,8	-	3,8	8,5	-	1,7·10 <sup>5</sup>	2,1·10 <sup>5</sup>	-
L7V	2,8	4,7	-	6,4	14,2	-	4,3·10 <sup>5</sup>	3,3·10 <sup>5</sup>	-
AL7V	2,2	5,9	4,3	15,1	22,7	197,6	1,4·10 <sup>5</sup>	2,6·10 <sup>5</sup>	2,0·10 <sup>4</sup>
ARL7V	1,4	5,5	3,9	8,9	17,5	41,4	1,7·10 <sup>5</sup>	3,1·10 <sup>5</sup>	9,3·10 <sup>4</sup>
35 ARVLF	1,4	7,2	0,2	12,3	44,8	6,5	9,2·10 <sup>4</sup>	1,6·10 <sup>5</sup>	3,5·10 <sup>4</sup>

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mutanten F87V und L7V für das Substrat 8-pNCA keinen messbaren Umsatz zeigen. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass die Vierfachmutante ARL7V eine noch bessere katalytische Effizienz aufweist als die Fünffachmutante  
40 ARVLF.

Die Mutanten ARL7V und ARVLF zeigen weiterhin hohe Aktivitäten für Caprinsäure (C10), die um zwei Kohlenstoffatome kürzer ist  
45 als das native kürzeste Fettsäure-Substrat des Wildtyp-Enzyms.

## 21

Außerdem wurden  $\omega$ -4-monohydroxylierte Produkte beobachtet, wenn Laurinsäure (C12) als Substrat verwendet wird, wohingegen das Wildtyp-Enzym von P450 BM-3 nur in den Positionen  $\omega$ -1,  $\omega$ -2 und  $\omega$ -3 aktiv ist.

5

Beispiel 4: Bestimmung der bevorzugten Hydroxylierungsposition für Carbonsäuren unterschiedlicher Kettenlänge und verschiedene Mutanten und Vergleich mit dem Wildtyp-Enzym

10

Die Reaktionsansätze werden gemäß oben beschriebener Methode 6 aufgearbeitet und analysiert.

15

Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle 4 zusammengefasst.

Tabelle 4:

20

25

30

35

40

45

Hydroxylierungspositionen	Caprinsäure (C10) [%]	Laurinsäure (C12) [%]
Wildtyp		
$\omega$ -3	-	34
$\omega$ -2	-	28
$\omega$ -1	-	38
Mutante D7V		
$\omega$ -3	-	53
$\omega$ -2	-	30
$\omega$ -1	-	17
Mutante F87V		
$\omega$ -3	-	51
$\omega$ -2	-	25
$\omega$ -1	-	24
Mutante AL7V		
$\omega$ -3	-	28
$\omega$ -2	-	54
$\omega$ -1	-	18
Mutante AR7V		
$\omega$ -3	14	35
$\omega$ -2	33	50
$\omega$ -1	53	15
Mutante ARVLF		
$\omega$ -3	15	34

$\omega$ -2	30	53
$\omega$ -1	55	13

- 5 Auffallend bei der Hydroxylierung von Laurinsäure ist zunächst ein Wechsel der Regioselektivität beim Übergang vom Wildtyp zu P450 BM-3 F87V, das eine  $\omega$ -3-Hydroxylierung bevorzugt katalysiert, ebenso wie P450 BM-3 L7V. Beim Übergang zur Dreifachmutante ändert sich die Regioselektivität erneut, P450 BM-3 AL7V, P450 BM-3 ARL7V und P450 BM-3 ARVLF dirigieren die Hydroxylierung  
10 bevorzugt in die  $\omega$ -2-Position.

- Alle GC-Analysen zeigen, dass Caprinsäure nur von P450 BM-3 ARVLF und P450 BM-3 ARL7V umgesetzt wird, bei den anderen Mutanten  
15 wurde ein Umsatz unter 1 % festgestellt. Beide Enzyme weisen fast identische Regioselektivität, mit der Bevorzugung  $\omega$ -1-Position auf.

- Zur Bestimmung der Reaktionsausbeuten wurden Gaschromatogramme  
20 von Standards aufgenommen. Als Eduktstandard fand eine Caprinsäure- bzw. Laurinsäurelösung mit Dichlormethan als Lösungsmittel (Konzentration 0,5 mg/ml) Verwendung. Aufgrund der FID-Detektionsmethode können die Peakflächen von Edukt und Produkten nicht einfach zueinander ins Verhältnis gesetzt werden, da Moleküle un-  
25 unterschiedlicher Struktur- und Summenformel bei der Verbrennung unterschiedliche Ionenströme erzeugen. Diese Ionenströme sind nicht proportional zum Stoffmengenverhältnis von Edukt und Produkten. Als Produktstandard wurde deshalb käuflich erwerbbarer 10-Hydroxycaprinsäure bzw. 12-Hydroxylaurinsäure verwendet. Die  
30 Summenformeln der Standards und der Produkte sind gleich, und die Struktur unterscheidet sich nur in der Stellung der Hydroxylgruppe, weshalb bei gleichen Stoffmengen annähernd von gleichen detektierbaren Ionenströmen ausgegangen wird.

- 35 Bei den Hydroxylierungen von Caprinsäure mit P450 BM-3 ARVLF und P450 BM-3 ARL7V-Katalyse betrugen die kumulierten Ausbeuten an Produkt 57 % bzw. 38 %. Bei den Hydroxylierungen von Laurinsäure betrug die Ausbeute bei P450 BM-3 ARVLF-Katalyse 51 %, bei allen anderen Mutanten und dem Wildtyp zwischen 38 % und 40 %.

40

45

## Literatur

1. Boddupalli, S. S., et al., (1990) J. Biol. Chem. 265, 4233-4239
  - 5 2. Capdevilla, J. H., et al., (1996) J. Biol. Chem. 271, 22663-22671
  - 10 3. Graham-Lorence, S., et al., (1997) J. Biol. Chem. 272, 1127-1135
  4. Cleland, J. L. und Craik, C. S., Eds. (1996) Protein Engineering: Principles and Practice, Wiley-Liss, New York
  - 15 5. Kuchner, O. und Arnold, F. H., (1997) Trends Biotechnol. 15, 523-530
  6. Stemmer, W. P.C. (1994) Nature (London) 370, 389-391
  - 20 7. Bornscheuer, U. T., (1998) Angew. Chem 110, 3285-3288
  8. Bernstein, F. C., et al., (1977) J. Mol. Biol. 112, 525-542
  9. Li, H. und Poulos, T. L. (1997) Nat. Structural Biol. 4, 140-146
  - 25 10. Modi, S., et al., (1996) Nat. Structural Biol. 3, 414-417
  11. Ravichandran, K. G., et al., (1993) Science 261, 731-736
  - 30 12. Schwaneberg, U., et al., (1999) Anal. Biochem. 269, 359-366
  13. Oliver, C.F., et al., (1997) Biochemistry, 36, 1567-1572
  - 35 14. Schwaneberg, U., et al., J. Chromatography A, in press
  15. Cherry, J. R., et al., (1999) Nature Biotechnology, 17, 379-384
- 

40

58/sg

45



## SEQUENZPROTOKOLL

&lt;110&gt; BASF Aktiengesellschaft

&lt;120&gt; Modifizierte Cytochrom P450 Monooxygenasen

&lt;130&gt; M/40434

&lt;140&gt;

&lt;141&gt;

&lt;160&gt; 20

&lt;170&gt; PatentIn Ver. 2.1

&lt;210&gt; 1

&lt;211&gt; 3150

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Bacillus megaterium

&lt;220&gt;

&lt;221&gt; CDS

&lt;222&gt; (4)..(3150)

&lt;400&gt; 1

atg aca att aaa gaa atg cct cag cca aaa acg ttt gga gag ctt aaa	48
Thr Ile Lys Glu Met Pro Gln Pro Lys Thr Phe Gly Glu Leu Lys	
1 5 10 15	
aat tta ccg tta tta aac aca gat aaa ccg gtt caa gct ttg atg aaa	96
Asn Leu Pro Leu Leu Asn Thr Asp Lys Pro Val Gln Ala Leu Met Lys	
20 25 30	
att gcg gat gaa tta gga gaa atc ttt aaa ttc gag gcg cct ggt cgt	144
Ile Ala Asp Glu Leu Gly Glu Ile Phe Lys Phe Glu Ala Pro Gly Arg	
35 40 45	
gta acg cgc tac tta tca agt cag cgt cta att aaa gaa gca tgc gat	192
Val Thr Arg Tyr Leu Ser Ser Gln Arg Leu Ile Lys Glu Ala Cys Asp	
50 55 60	
a tca cgc ttt gat aaa aac tta agt caa gcg ctt aaa ttt gta cgt	240
Glu Ser Arg Phe Asp Lys Asn Leu Ser Gln Ala Leu Lys Phe Val Arg	
65 70 75	
gat ttt gca gga gac ggg tta ttt aca agc tgg acg cat gaa aaa aat	288
Asp Phe Ala Gly Asp Gly Leu Phe Thr Ser Trp Thr His Glu Lys Asn	
80 85 90 95	
tgga aaa aaa gcg cat aat atc tta ctt cca agc ttc agt cag cag gca	336
Trp Lys Lys Ala His Asn Ile Leu Leu Pro Ser Phe Ser Gln Gln Ala	
100 105 110	
atg aaa ggc tat cat gcg atg atg gtc gat atc gcc gtg cag ctt gtt	384
Met Lys Gly Tyr His Ala Met Met Val Asp Ile Ala Val Gln Leu Val	
115 120 125	
caa aag tgg gag cgt cta aat gca gat gag cat att gaa gta ccg gaa	432
Gln Lys Trp Glu Arg Leu Asn Ala Asp Glu His Ile Glu Val Pro Glu	
130 135 140	
gac atg aca cgt tta acg ctt gat aca att ggt ctt tgc ggc ttt aac	480
Asp Met Thr Arg Leu Thr Leu Asp Thr Ile Gly Leu Cys Gly Phe Asn	

145

150

155

tat cgc ttt aac agc ttt tac cga gat cag cct cat cca ttt att aca 528  
 Tyr Arg Phe Asn Ser Phe Tyr Arg Asp Gln Pro His Pro Phe Ile Thr  
 160 165 170 175

agt atg gtc cgt gca ctg gat gaa gca atg aac aag ctg cag cga gca 576  
 Ser Met Val Arg Ala Leu Asp Glu Ala Met Asn Lys Leu Gln Arg Ala  
 180 185 190

aat cca gac gac ccg gct tat gat gaa aac aag cgc cag ttt caa gaa 624  
 Asn Pro Asp Asp Pro Ala Tyr Asp Glu Asn Lys Arg Gln Phe Gln Glu  
 195 200 205

gat atc aag gtg atg aac gac cta gta gat aaa att att gca gat cgc 672  
 Asp Ile Lys Val Met Asn Asp Leu Val Asp Lys Ile Ile Ala Asp Arg  
 210 215 220

aaa gca agc ggt gaa caa agc gat gat tta tta acg cat atg cta aac 720  
 Asn Ala Ser Gly Glu Gln Ser Asp Asp Leu Leu Thr His Met Leu Asn  
 225 230 235

gga aaa gat cca gaa acg ggt gag ccg ctt gat gac gag aac att cgc 768  
 Gly Lys Asp Pro Glu Thr Gly Glu Pro Leu Asp Asp Glu Asn Ile Arg  
 240 245 250 255

tat caa att att aca ttc tta att gcg gga cac gaa aca aca agt ggt 816  
 Tyr Gln Ile Ile Thr Phe Leu Ile Ala Gly His Glu Thr Thr Ser Gly  
 260 265 270

ctt tta tca ttt gcg ctg tat ttc tta gtg aaa aat cca cat gta tta 864  
 Leu Leu Ser Phe Ala Leu Tyr Phe Leu Val Lys Asn Pro His Val Leu  
 275 280 285

caa aaa gca gca gaa gaa gca gca cga gtt cta gta gat cct gtt cca 912  
 Gln Lys Ala Ala Glu Glu Ala Arg Val Leu Val Asp Pro Val Pro  
 290 295 300

agc tac aaa caa gtc aaa cag ctt aaa tat gtc ggc atg gtc tta aac 960  
 Ser Tyr Lys Gln Val Lys Gln Leu Lys Tyr Val Gly Met Val Leu Asn  
 305 310 315

gaa gcg ctg cgc tta tgg cca act gct cct gcg ttt tcc cta tat gca 1008  
 Glu Ala Leu Arg Leu Trp Pro Thr Ala Pro Ala Phe Ser Leu Tyr Ala  
 320 325 330 335

aaa gaa gat acg gtg ctt gga gga gaa tat cct tta gaa aaa ggc gac 1056  
 Lys Glu Asp Thr Val Leu Gly Gly Glu Tyr Pro Leu Glu Lys Gly Asp  
 340 345 350

gaa cta atg gtt ctg att cct aag ctt cac cgt gat aaa aca att tgg 1104  
 Glu Leu Met Val Leu Ile Pro Gln Leu His Arg Asp Lys Thr Ile Trp  
 355 360 365

gga gac gat gtg gaa gag ttc cgt cca gag cgt ttt gaa aat cca agt 1152  
 Gly Asp Asp Val Glu Glu Phe Arg Pro Glu Arg Phe Glu Asn Pro Ser  
 370 375 380

gcg att ccg cag cat gcg ttt aaa ccg ttt gga aac ggt cag cgt gcg 1200  
 Ala Ile Pro Gln His Ala Phe Lys Pro Phe Gly Asn Gly Gln Arg Ala  
 385 390 395

tgt atc ggt cag cag ttc gct ctt cat gaa gca acg ctg gta ctt ggt 1248

Cys Ile Gly Gln Gln Phe Ala Leu His Glu Ala Thr Leu Val Leu Gly	
400 405 410 415	
atg atg cta aaa cac ttt gac ttt gaa gat cat aca aac tac gag ctg	1296
Met Met Leu Lys His Phe Asp Phe Glu Asp His Thr Asn Tyr Glu Leu	
420 425 430	
gat att aaa gaa act tta acg tta aaa cct gaa ggc ttt gtg gta aaa	1344
Asp Ile Lys Glu Thr Leu Thr Leu Lys Pro Glu Gly Phe Val Val Lys	
435 440 445	
gca aaa tcg aaa aaa att ccg ctt ggc ggt att cct tca cct agc act	1392
Ala Lys Ser Lys Lys Ile Pro Leu Gly Gly Ile Pro Ser Pro Ser Thr	
450 455 460	
gaa cag tct gct aaa aaa gta cgc aaa aag gca gaa aac gct cat aat	1440
Glu Gln Ser Ala Lys Lys Val Arg Lys Lys Ala Glu Asn Ala His Asn	
465 470 475	
gag ccg ctg ctt gtg cta tac ggt tca aat atg gga aca gct gaa gga	1488
Pro Leu Leu Val Leu Tyr Gly Ser Asn Met Gly Thr Ala Glu Gly	
480 485 490 495	
acg gcg cgt gat tta gca gat att gca atg agc aaa gga ttt gca ccg	1536
Thr Ala Arg Asp Leu Ala Asp Ile Ala Met Ser Lys Gly Phe Ala Pro	
500 505 510	
cag gtc gca acg ctt gat tca cac gcc gga aat ctt ccg cgc gaa gga	1584
Gln Val Ala Thr Leu Asp Ser His Ala Gly Asn Leu Pro Arg Glu Gly	
515 520 525	
gct gta tta att gta acg gcg tct tat aac ggt cat ccg cct gat aac	1632
Ala Val Leu Ile Val Thr Ala Ser Tyr Asn Gly His Pro Pro Asp Asn	
530 535 540	
gca aag caa ttt gtc gac tgg tta gac caa gcg tct gct gat gaa gta	1680
Ala Lys Gln Phe Val Asp Trp Leu Asp Gln Ala Ser Ala Asp Glu Val	
545 550 555	
aaa ggc gtt cgc tac tcc gta ttt gga tgc ggc gat aaa aac tgg gct	1728
Gly Val Arg Tyr Ser Val Phe Gly Cys Gly Asp Lys Asn Trp Ala	
560 565 570 575	
act acg tat caa aaa gtg cct gct ttt atc gat gaa acg ctt gcc gct	1776
Thr Thr Tyr Gln Lys Val Pro Ala Phe Ile Asp Glu Thr Leu Ala Ala	
580 585 590	
aaa ggg gca gaa aac atc gct gac cgc ggt gaa gca gat gca agc gac	1824
Lys Gly Ala Glu Asn Ile Ala Asp Arg Gly Glu Ala Asp Ala Ser Asp	
595 600 605	
gac ttt gaa ggc aca tat gaa gaa tgg cgt gaa cat atg tgg agt gac	1872
Asp Phe Glu Gly Thr Tyr Glu Glu Trp Arg Glu His Met Trp Ser Asp	
610 615 620	
gta gca gcc tac ttt aac ctc gac att gaa aac agt gaa gat aat aaa	1920
Val Ala Ala Tyr Phe Asn Leu Asp Ile Glu Asn Ser Glu Asp Asn Lys	
625 630 635	
tct act ctt tca ctt caa ttt gtc gac agc gcc gcg gat atg ccg ctt	1968
Ser Thr Leu Ser Leu Gln Phe Val Asp Ser Ala Ala Asp Met Pro Leu	
640 645 650 655	

gcg aaa atg cac ggt gcg ttt tca acg aac gtc gta gca agc aaa gaa	2016
Ala Lys Met His Gly Ala Phe Ser Thr Asn Val Val Ala Ser Lys Glu	
660 665 670	
ctt caa cag cca ggc agt gca cga agc acg cga cat ctt gaa att gaa	2064
Leu Gln Gln Pro Gly Ser Ala Arg Ser Thr Arg His Leu Glu Ile Glu	
675 680 685	
ctt cca aaa gaa gct tct tata caa gaa gga gat cat tta ggt gtt att	2112
Leu Pro Lys Glu Ala Ser Tyr Gln Glu Gly Asp His Leu Gly Val Ile	
690 695 700	
cct cgc aac tat gaa gga ata gta aac cgt gta aca gca agg ttc ggc	2160
Pro Arg Asn Tyr Glu Gly Ile Val Asn Arg Val Thr Ala Arg Phe Gly	
705 710 715	
cta gat gca tca cag caa atc cgt ctg gaa gca gaa gaa gaa aaa tta	2208
Leu Asp Ala Ser Gln Gln Ile Arg Leu Glu Ala Glu Glu Glu Lys Leu	
720 725 730 735	
cat ttg cca ctc gct aaa aca gta tcc gta gaa gag ctt ctg caa	2256
His Leu Pro Leu Ala Lys Thr Val Ser Val Glu Glu Leu Leu Gln	
740 745 750	
tac gtg gag ctt caa gat cct gtt acg egc acg cag ctt egc gca atg	2304
Tyr Val Glu Leu Gln Asp Pro Val Thr Arg Thr Gln Leu Arg Ala Met	
755 760 765	
gct gct aaa acg gtc tgc ccg ccg cat aaa gta gag ctt gaa gcc atg	2352
Ala Ala Lys Thr Val Cys Pro Pro His Lys Val Glu Leu Glu Ala Leu	
770 775 780	
ctt gaa aag caa gcc tac aaa gaa caa gtg ctg gca aaa cgt tta aca	2400
Leu Glu Lys Gln Ala Tyr Lys Glu Gln Val Leu Ala Lys Arg Leu Thr	
785 790 795	
atg ctt gaa ctg ctt gaa aaa tac ccg gcg tgt gaa atg aaa ttc agc	2448
Met Leu Glu Leu Leu Glu Lys Tyr Pro Ala Cys Glu Met Lys Phe Ser	
800 805 810 815	
ttt atc gcc ctt ctg cca agc ata cgc ccg cgc tat tac tcg att	2496
Phe Ile Ala Leu Leu Pro Ser Ile Arg Pro Arg Tyr Tyr Ser Ile	
820 825 830	
tct tca tca cct cgt gtc gat gaa aaa caa gca agc atc acg gtc agc	2544
Ser Ser Ser Pro Arg Val Asp Glu Lys Gln Ala Ser Ile Thr Val Ser	
835 840 845	
gtt gtc tca gga gaa gcg tgg agc gga tat gga gaa tat aaa gga att	2592
Val Val Ser Gly Glu Ala Trp Ser Gly Tyr Gly Glu Tyr Lys Gly Ile	
850 855 860	
gcg tcg aac tat ctt gcc gag ctg caa gaa gga gat acg att acg tgc	2640
Ala Ser Asn Tyr Leu Ala Glu Leu Gln Glu Gly Asp Thr Ile Thr Cys	
865 870 875	
ttt att tcc aca ccg cag tca gaa ttt acg ctg cca aaa gac cct gaa	2688
Phe Ile Ser Thr Pro Gln Ser Glu Phe Thr Leu Pro Lys Asp Pro Glu	
880 885 890 895	
acg ccg ctt atc atg gtc gga ccg gga aca ggc gtc gcg ccg ttt aga	2736
Thr Pro Leu Ile Met Val Gly Pro Gly Thr Gly Val Ala Pro Phe Arg	
900 905 910	

ggc ttt gtg cag gcg cgc aaa cag cta aaa gaa caa gga cag tca ctt 2784  
 Gly Phe Val Gln Ala Arg Lys Gln Leu Lys Glu Gln Gly Gln Ser Leu  
 915 920 925  
 gga gaa gca cat tta tac ttc ggc tgc cgt tca cct cat gaa gac tat 2832  
 Gly Glu Ala His Leu Tyr Phe Gly Cys Arg Ser Pro His Glu Asp Tyr  
 930 935 940  
 ctg tat caa gaa gag ctt gaa aac gcc caa agc gaa ggc atc att acg 2880  
 Leu Tyr Gln Glu Glu Leu Glu Asn Ala Gln Ser Glu Gly Ile Ile Thr  
 945 950 955  
 ctt cat acc gct ttt tct cgc atg cca aat cag ccg aaa aca tac gtt 2928  
 Leu His Thr Ala Phe Ser Arg Met Pro Asn Gln Pro Lys Thr Tyr Val  
 960 965 970 975  
 cag cac gta atg gaa caa gac ggc aag aaa ttg att gaa ctt ctt gat 2976  
 Gln His Val Met Glu Gln Asp Gly Lys Lys Leu Ile Glu Leu Leu Asp  
 980 985 990  
 a gga gcg cac ttc tat att tgc gga gac gga agc caa atg gca cct 3024  
 Gln Gly Ala His Phe Tyr Ile Cys Gly Asp Gly Ser Gln Met Ala Pro  
 995 1000 1005  
 gcc gtt gaa gca acg ctt atg aaa agc tat gct gac gtt cac caa gtg 3072  
 Ala Val Glu Ala Thr Leu Met Lys Ser Tyr Ala Asp Val His Gln Val  
 1010 1015 1020  
 agt gaa gca gac gct cgc tta tgg ctg cag cag cta gaa gaa aaa ggc 3120  
 Ser Glu Ala Asp Ala Arg Leu Trp Leu Gln Gln Leu Glu Glu Lys Gly  
 1025 1030 1035  
 cga tac gca aaa gac gtg tgg gct ggg taa 3150  
 Arg Tyr Ala Lys Asp Val Trp Ala Gly  
 1040 1045

&lt;210&gt; 2

&lt;211&gt; 1048

&lt;12&gt; PRT

&lt;13&gt; Bacillus megaterium

&lt;400&gt; 2

Thr Ile Lys Glu Met Pro Gln Pro Lys Thr Phe Gly Glu Leu Lys Asn  
 1 5 10 15

Leu Pro Leu Leu Asn Thr Asp Lys Pro Val Gln Ala Leu Met Lys Ile  
 20 25 30

Ala Asp Glu Leu Gly Glu Ile Phe Lys Phe Glu Ala Pro Gly Arg Val  
 35 40 45

Thr Arg Tyr Leu Ser Ser Gln Arg Leu Ile Lys Glu Ala Cys Asp Glu  
 50 55 60

Ser Arg Phe Asp Lys Asn Leu Ser Gln Ala Leu Lys Phe Val Arg Asp  
 65 70 75 80

Phe Ala Gly Asp Gly Leu Phe Thr Ser Trp Thr His Glu Lys Asn Trp  
 85 90 95

Lys Lys Ala His Asn Ile Leu Leu Pro Ser Phe Ser Gln Gln Ala Met

100

105

110

Lys Gly Tyr His Ala Met Met Val Asp Ile Ala Val Gln Leu Val Gln  
 115 120 125

Lys Trp Glu Arg Leu Asn Ala Asp Glu His Ile Glu Val Pro Glu Asp  
 130 135 140

Met Thr Arg Leu Thr Leu Asp Thr Ile Gly Leu Cys Gly Phe Asn Tyr  
 145 150 155 160

Arg Phe Asn Ser Phe Tyr Arg Asp Gln Pro His Pro Phe Ile Thr Ser  
 165 170 175

Met Val Arg Ala Leu Asp Glu Ala Met Asn Lys Leu Gln Arg Ala Asn  
 180 185 190

Pro Asp Asp Pro Ala Tyr Asp Glu Asn Lys Arg Gln Phe Gln Glu Asp  
 195 200 205

Lys Val Met Asn Asp Leu Val Asp Lys Ile Ile Ala Asp Arg Lys  
 210 215 220

Ala Ser Gly Glu Gln Ser Asp Asp Leu Leu Thr His Met Leu Asn Gly  
 225 230 235 240

Lys Asp Pro Glu Thr Gly Glu Pro Leu Asp Asp Glu Asn Ile Arg Tyr  
 245 250 255

Gln Ile Ile Thr Phe Leu Ile Ala Gly His Glu Thr Thr Ser Gly Leu  
 260 265 270

Leu Ser Phe Ala Leu Tyr Phe Leu Val Lys Asn Pro His Val Leu Gln  
 275 280 285

Lys Ala Ala Glu Glu Ala Ala Arg Val Leu Val Asp Pro Val Pro Ser  
 290 295 300

Tyr Lys Gln Val Lys Gln Leu Lys Tyr Val Gly Met Val Leu Asn Glu  
 305 310 315 320

Leu Arg Leu Trp Pro Thr Ala Pro Ala Phe Ser Leu Tyr Ala Lys  
 325 330 335

Glu Asp Thr Val Leu Gly Gly Glu Tyr Pro Leu Glu Lys Gly Asp Glu  
 340 345 350

Leu Met Val Leu Ile Pro Gln Leu His Arg Asp Lys Thr Ile Trp Gly  
 355 360 365

Asp Asp Val Glu Glu Phe Arg Pro Glu Arg Phe Glu Asn Pro Ser Ala  
 370 375 380

Ile Pro Gln His Ala Phe Lys Pro Phe Gly Asn Gly Gln Arg Ala Cys  
 385 390 395 400

Ile Gly Gln Gln Phe Ala Leu His Glu Ala Thr Leu Val Leu Gly Met  
 405 410 415

Met Leu Lys His Phe Asp Phe Glu Asp His Thr Asn Tyr Glu Leu Asp  
 420 425 430

Ile Lys Glu Thr Leu Thr Leu Lys Pro Glu Gly Phe Val Val Lys Ala

435

440

445

Lys Ser Lys Lys Ile Pro Leu Gly Gly Ile Pro Ser Pro Ser Thr Glu  
450 455 460

Gln Ser Ala Lys Lys Val Arg Lys Lys Ala Glu Asn Ala His Asn Thr  
465 470 475 480

Pro Leu Leu Val Leu Tyr Gly Ser Asn Met Gly Thr Ala Glu Gly Thr  
485 490 495

Ala Arg Asp Leu Ala Asp Ile Ala Met Ser Lys Gly Phe Ala Pro Gln  
500 505 510

Val Ala Thr Leu Asp Ser His Ala Gly Asn Leu Pro Arg Glu Gly Ala  
515 520 525

Val Leu Ile Val Thr Ala Ser Tyr Asn Gly His Pro Pro Asp Asn Ala  
530 535 540

As Gln Phe Val Asp Trp Leu Asp Gln Ala Ser Ala Asp Glu Val Lys  
545 550 555 560

Gly Val Arg Tyr Ser Val Phe Gly Cys Gly Asp Lys Asn Trp Ala Thr  
565 570 575

Thr Tyr Gln Lys Val Pro Ala Phe Ile Asp Glu Thr Leu Ala Ala Lys  
580 585 590

Gly Ala Glu Asn Ile Ala Asp Arg Gly Glu Ala Asp Ala Ser Asp Asp  
595 600 605

Phe Glu Gly Thr Tyr Glu Glu Trp Arg Glu His Met Trp Ser Asp Val  
610 615 620

Ala Ala Tyr Phe Asn Leu Asp Ile Glu Asn Ser Glu Asp Asn Lys Ser  
625 630 635 640

Thr Leu Ser Leu Gln Phe Val Asp Ser Ala Ala Asp Met Pro Leu Ala  
645 650 655

As Met His Gly Ala Phe Ser Thr Asn Val Val Ala Ser Lys Glu Leu  
660 665 670

Gln Gln Pro Gly Ser Ala Arg Ser Thr Arg His Leu Glu Ile Glu Leu  
675 680 685

Pro Lys Glu Ala Ser Tyr Gln Glu Gly Asp His Leu Gly Val Ile Pro  
690 695 700

Arg Asn Tyr Glu Gly Ile Val Asn Arg Val Thr Ala Arg Phe Gly Leu  
705 710 715 720

Asp Ala Ser Gln Gln Ile Arg Leu Glu Ala Glu Glu Glu Lys Leu Ala  
725 730 735

His Leu Pro Leu Ala Lys Thr Val Ser Val Glu Glu Leu Leu Gln Tyr  
740 745 750

Val Glu Leu Gln Asp Pro Val Thr Arg Thr Gln Leu Arg Ala Met Ala  
755 760 765

Ala Lys Thr Val Cys Pro Pro His Lys Val Glu Leu Glu Ala Leu Leu

770

775

780

Glu Lys Gln Ala Tyr Lys Glu Gln Val Leu Ala Lys Arg Leu Thr Met  
785 790 795 800

Leu Glu Leu Leu Glu Lys Tyr Pro Ala Cys Glu Met Lys Phe Ser Glu  
805 810 815

Phe Ile Ala Leu Leu Pro Ser Ile Arg Pro Arg Tyr Tyr Ser Ile Ser  
820 825 830

Ser Ser Pro Arg Val Asp Glu Lys Gln Ala Ser Ile Thr Val Ser Val  
835 840 845

Val Ser Gly Glu Ala Trp Ser Gly Tyr Gly Glu Tyr Lys Gly Ile Ala  
850 855 860

Ser Asn Tyr Leu Ala Glu Leu Gln Glu Gly Asp Thr Ile Thr Cys Phe  
865 870 875 880

Ser Thr Pro Gln Ser Glu Phe Thr Leu Pro Lys Asp Pro Glu Thr  
885 890 895

Pro Leu Ile Met Val Gly Pro Gly Thr Gly Val Ala Pro Phe Arg Gly  
900 905 910

Phe Val Gln Ala Arg Lys Gln Leu Lys Glu Gln Gly Gln Ser Leu Gly  
915 920 925

Glu Ala His Leu Tyr Phe Gly Cys Arg Ser Pro His Glu Asp Tyr Leu  
930 935 940

Tyr Gln Glu Glu Leu Glu Asn Ala Gln Ser Glu Gly Ile Ile Thr Leu  
945 950 955 960

His Thr Ala Phe Ser Arg Met Pro Asn Gln Pro Lys Thr Tyr Val Gln  
965 970 975

His Val Met Glu Gln Asp Gly Lys Lys Leu Ile Glu Leu Leu Asp Gln  
980 985 990

Y Ala His Phe Tyr Ile Cys Gly Asp Gly Ser Gln Met Ala Pro Ala  
995 1000 1005

Val Glu Ala Thr Leu Met Lys Ser Tyr Ala Asp Val His Gln Val Ser  
1010 1015 1020

Glu Ala Asp Ala Arg Leu Trp Leu Gln Gln Leu Glu Glu Lys Gly Arg  
1025 1030 1035 1040

Tyr Ala Lys Asp Val Trp Ala Gly  
1045

&lt;210&gt; 3

&lt;211&gt; 30

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Künstliche Sequenz

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer



<400> 3  
gcaggagacg gggtggnnac aagctggacg

30

<210> 4  
<211> 30  
<212> DNA  
<213> Künstliche Sequenz

<220>  
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 4  
cgtccagctt gttnncaacc cgtctcctgc

30

<210> 5  
<211> 34  
<212> DNA  
<213> Künstliche Sequenz

<220>  
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 5  
gaagcaatga acaagnnnca gcgagcaaat ccag

34

<210> 6  
<211> 34  
<212> DNA  
<213> Künstliche Sequenz

<220>  
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 6  
ctggatttgc tcgctggnnc ttgttcattg cttc

34

<210> 7  
<211> 41  
<212> DNA  
<213> Künstliche Sequenz

<220>  
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 7  
gctttgataa aaacttaaag tcaannnctt aaatttgtac g

41

<210> 8  
<211> 40  
<212> DNA  
<213> Künstliche Sequenz

<220>  
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 8  
cgtacaaatt taagnnnttg acttaagttt ttatcaaagc

40

<210> 9  
 <211> 37  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>

<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 9  
 gttattaaac acagataaannngttcaagc ttgatg

37

<210> 10  
 <211> 37  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>

<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 10  
 catcaaagct tgaacnnntt tatctgtgtt taataac

37

<210> 11  
 <211> 37  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>

<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 11  
 gttattaaac acagataaac cgnnncaagc ttgatg

37

<210> 12  
 <211> 37  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>

<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 12  
 catcaaagct tgnnncggtt tatctgtgtt taataac

37

<210> 13  
 <211> 33  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>

<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 13  
 cgaggcgctt ggtnnngtaa cgcgctactt atc

33

<210> 14  
 <211> 33

<212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>  
 <223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 14  
 gataagtagc gcgttacnnn accaggcgcc tcg

33

<210> 15  
 <211> 34  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>  
 <223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 15  
 ctggtcgtg taacgcgcnn nttatcaagt cagc

34

<210> 16  
 <211> 34  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>  
 <223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 16  
 gctgacttga taannngcgc gttacacgac cagg

34

<210> 17  
 <211> 40  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>  
 <223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 17  
 gctttgataa aaacttannn caagcgctta aatttgtacg

40

<210> 18  
 <211> 40  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>  
 <223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 18  
 cgtacaaatt taagcgcttg nnntaagttt ttatcaaagc

40

<210> 19  
 <211> 30  
 <212> DNA  
 <213> Künstliche Sequenz

<220>

<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 19

ggcgacgaac tannngttct gattcctcag

30

<210> 20

<211> 30

<212> DNA

<213> Künstliche Sequenz

<220>

<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 20

ctgaggaatc agaacnnnta gttcgtcgcc

30

## Patentansprüche

1. Modifizierte Cytochrom P450 Monooxygenase, welche durch orts-  
spezifische Mutagenese ihres Substrat-bindenden Bereichs im  
Vergleich zum Wildtyp ein verändertes Substratprofil bei der  
terminalen und/oder subterminalen enzymatischen Hydroxylierung  
von aliphatischen Carbonsäuren zeigt.
2. Monooxygenase nach Anspruch 1, abgeleitet von Cytochrom P450  
Monooxygenasen bakteriellen Ursprungs.
3. Monooxygenase nach Anspruch 2, abgeleitet von Cytochrom P450  
Monooxygenase BM-3 aus *Bacillus megaterium* mit einer Amino-  
säuresequenz gemäß SEQ ID NO:2, welche wenigstens eine funk-  
tionale Mutation in einem der folgenden Aminosäuresequenzbe-  
reiche aufweist: 24-28, 45-51, 70-72, 73-82, 86-88, 172-224  
und 352-356, mit der Maßgabe, dass mehr als einer dieser Be-  
reiche mutiert ist, wenn das Enzym die Mutation F87A trägt.
4. Monooxygenase nach Anspruch 3, enthaltend wenigstens je eine  
funktionale Mutation in den Aminosäuresequenzbereichen 86-88  
und 172-224.
5. Monooxygenase nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass  
sie wenigstens eines der folgenden Aminosäuresubstitutionsmu-  
ster aufweist:
- a) F87V;
  - b) F87A L188K;
  - c) F87V L188K;
  - d) F87A L188K A74G;
  - e) F87V L188K A74G;
  - f) F87A L188K A74G R47F;
  - g) F87V L188K A74G R47F;
  - h) F87A L188K A74G R47F V26T; oder
  - i) F87V L188K A74G R47F V26T;

sowie funktionale Äquivalente davon.

NAE 2061/99 UP/58 10.03.2000

## 2

6. Monooxygenase nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine einzelne der folgenden Aminosäuresubstitutionen aufweist:
- 5      a) V26T,  
      b) R47F,  
      c) S72G,  
      d) A74G,  
      e) F87V,
- 10     f) L188z, worin z für eine Aminosäure, ausgewählt unter K, R, W, Q, N, G, A und S steht; und  
      g) M354T;
- sowie funktionale Äquivalente davon.
- 15     7. Nukleinsäuresequenz kodierend für eine Monooxygenase nach einem der vorherigen Ansprüche.
- 20     8. Expressionskonstrukt, enthaltend unter der genetischen Kontrolle regulativer Nukleinsäuresequenzen eine kodierende Sequenz, welche eine Nukleinsäuresequenz nach Anspruch 7 umfasst.
- 25     9. Vektor, umfassend wenigstens ein Expressionskonstrukt nach Anspruch 8.
10. Rekombinanter Mikroorganismus, transformiert mit wenigstens einem Vektor nach Anspruch 9.
- 30     11. Mikroorganismus nach Anspruch 10, ausgewählt unter Bakterien der Gattung Escherichia.
12. Verfahren zur enzymatischen Herstellung von terminal oder subterminal hydroxylierten aliphatischen Carbonsäuren, dadurch gekennzeichnet, dass man
- 35     a1) einen rekombinanten Mikroorganismus nach Anspruch 10 oder 11 in Gegenwart eines Kulturmediums, das die wenigstens eine hydroxylierbare Carbonsäure oder wenigstens ein hydroxylierbares Carbonsäurederivat kultiviert; oder
- 40     a2) ein Reaktionsmedium, enthaltend wenigstens eine hydroxylierbare Carbonsäure oder wenigstens ein hydroxylierbares Carbonsäurederivat, mit einem Enzym nach einem der Ansprüche 1 bis 6 inkubiert; und
- 45

3

b) das gebildete hydroxylierte Produkt aus dem Medium isoliert.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass man  
5 als hydroxylierbare Carbonsäure eine C<sub>8</sub>-C<sub>30</sub>-Monocarbonsäure oder ein Derivat davon einsetzt.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass man  
10 als hydroxylierbare Carbonsäure eine C<sub>8</sub>-C<sub>12</sub>-Monocarbonsäure oder ein Derivat davon und als Monooxygenase eine Mutante gemäß Anspruch 5 einsetzt.
15. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass man  
15 als hydroxylierbare Carbonsäure eine C<sub>12</sub>-C<sub>30</sub>-Monocarbonsäure oder ein Derivat davon und als Monooxygenase eine Mutante ausgewählt unter den Einfachmutanten F87A, F87V, V26T, S72G, A74G und M354T, und den Mehrfachmutanten  
F87A L188K A74G R47F;  
F87V L188K A74G R47F;  
20 F87A L188K A74G R47F V26T; oder  
F87V L188K A74G R47F V26T;  
einsetzt.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass man die Reaktion in Gegenwart eines Elektronendonors oder Reduktionsäquivalents durchführt.  
25
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektronendonator oder das Reduktionsäquivalent ausgewählt ist  
30 unter NADH, NADPH und Zn/Co(III)sepulchrat.

35

58/sg

40

45

## Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft modifizierte Cytochrom  
5 P450-Monooxygenasen mit verändertem Substratprofil, dafür kodie-  
~~rende Nukleinsäuresequenzen, Expressionskonstrukte und Vektoren,~~  
~~rekombinante Mikroorganismen, welche diese Vektoren enthalten so-~~  
~~wie Verfahren zur mikrobiologischen Herstellung terminal oder~~  
~~subterminal hydroxylierter aliphatischer Carbonsäuren.~~

10

15

20

25

30

35


40

45





**Fig. 1**



**Fig.2**